

ЛІМАЦИД

Біологічний молюскоцид



Молюскоцидний засіб
контактно-кишкової дії від
різних видів слимаків та равликів



Діюча речовина

1% фосфату заліза, 2% - харчовий аттрактант *Saccharomyces cerevisiae*, 97% - наповнювач-принада рослинного походження



Упаковка

80 г, кількість в упаковці: 27 шт.



Умови зберігання

Зберігати препарат в герметичній упаковці, сухому та захищеному від світла місці за температури від мінус 5 °С до +25 °С.



Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

СПОСІБ ВНЕСЕННЯ

Розкидання/розкладання по площі в місцях скупчення шкідників

НОРМА ВИТРАТИ

80 г / 1 сотку

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

Препарат володіє контактно-кишковою дією.

Контактна дія препарату проявляється невдовзі після контакту поверхні тіла молюсків із препаратом, що викликає опіки тіла та загибель шкідників.

Кишкова - після поїдання гранули препарату слимаками та равликами, що згодом викликає зупинку травлення. Гранули містять речовини з привабливим для молюсків запахом та смаком, що пришвидшує поїдання їх молюсками.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Препарат рівномірно розсипають/розкладають в місцях пересування та розмноження слимаків та равликів.
- У випадку використання на грядках, квітниках, тощо – вносити в рядки, не ближче ніж 10-20 см до рослини.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

- Гранульований препарат-принада призначений для боротьби з равликами та слимаками. Дія препарату проявляється невдовзі після контакту поверхні молюсків з препаратом та поїдання гранули слимаками, що згодом спричиняє їх загибель.
- Для використання на присадибних ділянках, спортивних зонах, у виробничих, санітарно-побутових, господарських спорудах (приміщеннях) та інших об'єктах, в місцях масового відпочинку, в підвалах, підсобних приміщеннях і в місцях розташування пожежних ємностей і смітєвих контейнерів, у всіх місцях розвитку та розмноження молюсків.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ

- Висока ефективність проти слимаків та равликів.
- Максимально контролює молюсків та равликів у місцях пересування та запобігає їх розмноженню.
- Перші ознаки дії препарату спостерігаються з перших годин внесення, масова загибель настає на 3-6 добу.
- Препарат-принада приваблива для молюсків навіть за наявності корму.
- Низька токсичність для не цільових об'єктів: дощових черв'яків, бджіл, корисних комах.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях недоступних для дітей та домашніх тварин! Під час застосування дотримуватися правил особистої гігієни, не вживати їжу, не пити, не палити. Після застосування препарату вимити руки та обличчя з милом.



ENZIM

BIOTECH AGRO

AGRO.ENZIM.BIZ

21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 30



(044) 499 88 01

(067) 582 33 22

(095) 582 33 22

agro@enzim.biz

(098) 900 900 3

