

BINOC TK

Сухий інокулянт для
технічних культур



Комплексний інокулянт на основі
графітно-талькової суміші для передпосівного
обробітку насіння (включаючи протруєне)
цукрових буряків, ріпаку, гірчиці з метою
отримання максимальної реалізації
потенціалу культури



Діюча речовина

Відібрані мікробіологічні культури – антагоністи збудників коренових гнилей, культури-азотфіксатори та фосфор-калій мобілізатори, фітогормони, антибіотики, вітаміни, амінокислоти і регулятори росту, набір ключових мікроелементів. Загальний титр: не менше 1×10^{11} КУО/г.



Препаративна форма

Нерозчинний порошок.



Упаковка

0,5 кг – пакет zip-lock.



Умови зберігання

Препарат зберігати за t° від $+2^{\circ} \text{C}$ до $+25^{\circ} \text{C}$ в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.



Термін придатності

12 місяців.

КУЛЬТУРИ	НОРМА ВИТРАТ
Цукровий буряк	0,05 кг на 3 посівні одиниці
Ріпак, гірчиця	0,05–0,075 кг на 1,5 млн. насінин
	0,075 кг на 10 кг насіння
Гарбузи	0,10 кг на 10 кг насіння

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

- Підвищення на 10–20% енергії проростання насіння навіть за стресових умов.
- Швидке формування потужної кореневої системи.
- Формування ризосфери з корисної мікрофлори.
- Пригнічення ґрунтових збудників бактеріальних і грибних хвороб впродовж всього періоду вегетації.
- Зниження фітотоксичної дії при застосуванні ґрунтових гербіцидів, протруювачів.
- Підвищення врожайності культур на 7–19%.
- Застосування препарату дає можливість заощадити на використанні компонентів для змащування механізмів сівалок на основі тальку та графіту.
- Покращення азотного та фосфор-калійного живлення рослин, підвищення коефіцієнту засвоєності поживних елементів з мінеральних добрив.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

- Препарат нерозчинний у воді.
- Призначений для обробки насіння тільки сухим методом в сівалках чи в мішках з насінням. Для чого його потрібно рівномірно розподілити по насінню в бункері сівалки або висипати потрібну норму препарату в мішок з насінням, добре перемішати та висипати у сівалку. Для полегшення дозування препарату в упаковці міститься мірна ложка.
- Препарат можна наносити на насіння за 3 місяці до посіву.

СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ

- Інокулянт BINOC TK дозволяється застосовувати на попередньо протруєному насінні, проте протруєння насіння.



ENZIM
BIOTECH AGRO

ТОВ «ТД «Ензим-Агро»

21018, м. **Вінниця**,
вул. Гоголя, 30

(044) 499 88 01

(067) 582 33 22

(095) 582 33 22



(098) 900 900 3



agro.enzim.biz
agro@enzim.biz