






РІПАК ЯРИЙ

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ			MAStech® ҐРУНТ
Складові компоненти, л/га (т)	BINOC TK - 0,05 кг на 1,5 млн насінин	Урожай ТК - 1,0 Гумат Калію - 0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>інсектицид</i>	ФітоДоктор® - 1,0 Урожай Бор - 1,5 Гумат Калію - 0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Сульфат магнію - 5 кг/га</i>	Ксаладан - 1,5	Целлолад® - 2,0 Екоцелл® - 0,3-0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Аміачна селітра (КАС) - 20 кг/га</i>
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Заміна фосфорних добрив 25-50 кг/га д. р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Забезпечення молодих рослин мікроелементами. Зняття стресу від дії хімічних препаратів	Забезпечення рослин мікроелементами. Стимуляція росту рослин. Зняття стресу від дії хімічних препаратів.	Боротьба із збудниками грибних та бактеріальних хвороб. Забезпечення рослин бором. Покращення якості цвітіння та запилення квіток.	Зменшення розтріскування стручків. Збереження врожаю насіння.	Швидке розкладання поживних рештків, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.
Фаза					
	Обробка насіння	Внесення препаратів одночасно з гербіцидами	Бутонізація	За 2-4 тижні до збору урожаю	Відразу після збору урожаю