




ВИКА

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ	MAStech® ҐРУНТ
Складові компоненти, л/га (т)	BiNitro® Горох - 0,7-1,0 л/т або BiNitro® Горох СФ - 2,0 кг/т Біофосфорин® - 1,0-1,5 ФітоДоктор® - 1,0 Урожай СТАРТ - 0,1 Адюмакс® - 0,01	Гаубсин® FORTE - 1,5 Урожай Бобові - 1,0 Адюмакс® - 0,05-0,10 <i>Хімічний інсектицид</i>	Целолад® - 1,5 Екоцелл® - 0,3-0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10
Ефект	Фіксація азоту з повітря 60-90 кг/га д.р. (симбіотична азотфіксація). Формування потужної кореневої системи. Заміна фосфорних добрив 25-50 кг/га д.р. Захист проростків від бактеріальних та грибних хвороб.	Захист рослин від комплексу хвороб. Покращення зав'язування плодів, зменшення абортивності квіток, підвищення врожайності. Захист від горохового комарика та інших шкідників.	Швидке розкладання поживних решток сої, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.
Фаза			
	Передпосівний обробіток насіння	Бутонізація - початок цвітіння	Обприскування поживних залишків із одночасною заробкою