








## ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

Технологія	MAStech® СТАРТ	MAStech® ЛИСТ				MAStech® ҐРУНТ	
Складові компоненти, л/га (т)	ВІНОС Зернові - 2,0 Урожай СТАРТ - 0,2 Адюмакс® - 0,01  Тебуконазол (120 г/л) - 0,25 л/т	Гаубсин® FORTE - 2,0 Адюмакс® - 0,05-0,10	Аміачна селітра - 100-150 кг/га	ФітоДоктор® - 1,0-1,5 Урожай ЗЕРНО - 1,0 Гумат Калію - 0,5 * Адюмакс® - 0,05-0,10  Хлормекватхлорид (750 г/л) - 1,0-1,5 л/га 1-2 рази * У випадку стресу Гумат Калію слід замінити на FitoNis у тій же нормі	Viridin (Триходермін) - 1,0 Гаубсин® FORTE - 1,0 Урожай Зерно - 1,5 Гумат Калію - 0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10  Карбамід - 10,0 кг/га	Хімічний фунгіцид  Урожай Зерно - 1,2-1,5 Аміностим® - 1,0 Адюмакс® - 0,05-0,10  Карбамід - 10,0 кг/га	Целолад® - 1,5 Екоцелл® - 0,3-0,5 Адюмакс® - 0,05-0,10  Аміачна селітра (КАС) - 20 кг/га
Ефект	Підвищення енергії проростання та схожості насіння. Стимуляція росту кореневої системи та рослин. Фіксація азоту 15-20 кг/га д.р. Заміна фосфорних добрив 25-50 кг/га д.р та калійних до 15-20 кг/га д.р. Захист від бактеріальних та грибних хвороб. Забезпечення рослин необхідними елементами живлення та амінокислотами. Зняття стресу від дії хімічних препаратів.	Підвищення морозостійкості рослин, захист від снігової плісняви, борошнистої роси, гнилей.	Забезпечення рослин азотом	Захист рослин від комплексу хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами Покращення фотосинтезу. Підвищення стійкості до стресу.	Комплексний захист від хвороб. Стимуляція розвитку листової маси. Підвищення стійкості до стресу.	Захист рослин від хвороб. Забезпечення рослин мікроелементами. Підвищення якісних показників зерна та маси 1000 зерен.	Швидке розкладання поживних рештків, мінералізація NPK та позитивний баланс рухомих форм NPK в ґрунті під наступну культуру. Відновлення родючості та структури ґрунту, зниження кількості ґрунтових патогенів. Накопичення органічної речовини.
Фаза							
	Передпосівний обробіток насіння	Осіньне обприскування рослин (2 декада жовтня)	Обприскування по мерзлоталому ґрунту	Кінець куцання - вихід у трубку	Поява прапорцевого листка	Початок викидання колосу	Відразу після збору урожаю